

がん化学療法レジメン

第1版

改訂日

登録日	2019.4.11	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ	<input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	大腸(CK)–026		診療科名	消化器外科		
レジメン名	Bev+TFTD療法					
レジメン補足	ベバシズマブ+トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合錠					
がん腫など	切除不能進行・再発結腸・直腸癌					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
ベバシズマブ (アバスチン)	炎症	5mg/kg	●																																		
TFTD (ロンサーブ)		※下図参照		●	●	●	●	●				●	●	●	●	●																					
1 コース期間	28 日	目標コース数	<input type="checkbox"/> 有 (コース)							<input checked="" type="checkbox"/> 無 (PDまで)																											
点滴時間	Day1 : (初回) 1時間30分 (2回目) 1時間 (3回目以降) 30分																																				
注意事項など																																					

《TFTD投与量の目安》

体表面積(m ²)	1.07未満	1.07~	1.23~	1.38~	1.53~	1.69~	1.84~	1.99~	2.15~
TFTD1回内服量 (1日2回内服)	35mg	40mg	45mg	50mg	55mg	60mg	65mg	70mg	75mg

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	ルートキープ
②	生食	100mL	下記(※) 点滴
	ベバシズマブ	5mg/kg	
	※初回投与時は90分かける。初回投与時の忍容性が良好であれば2回目は60分で投与してもよい。2回目の投与においても忍容性が良好であればそれ以降は30分で投与とする。		
③	①の残りの生食でフラッシュ		