がん化学療法レジメン

第2版	改訂日	R1.10.10

登録日	H28.8.10	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	頭頸部(HN)-009	診療科名	耳鼻咽喉科		
レジメン名	セツキシマブ+PTX療法				
レジメン補足	セツキシマブ+パクリタキセル				
がん腫など	頭頸部癌				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
セツキシマブ(アービタックス)		(初回のみ) 400mg/m^2	○																											
セツキシマブ(アービタックス)		250mg/m^2								●							●							●						
パクリタキセル(タキソール)	壊死	80mg/m^2	●							●							●							●						
1コース期間	7 日		目標コース数							□有 (コース)											■無 (PDまで)									
点滴時間	Day1：(初回)4時間30分 (2回目以降)2時間30分																													
注意事項など	PVCフリー(フィルター付)の輸液セットを用いること																													

Day 1（初回のみ）

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	30分点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
	ファモチジン(ガスター)	20mg	
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	
②	生食	500mL	2時間点滴
	セツキシマブ	400mg/m^2	
③	生食	100mL	1時間点滴
④	5%ブドウ糖液	250mL	1時間点滴
	パクリタキセル	80mg/m^2	
⑤	生食	50mL	フラッシュ

Day 8以降（2回目以降）

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	30分点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
	ファモチジン(ガスター)	20mg	
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	
②	生食	250mL	1時間点滴
	セツキシマブ	250mg/m^2	
③	5%ブドウ糖液	250mL	1時間点滴
	パクリタキセル	80mg/m^2	
④	生食	50mL	フラッシュ