がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H18.9.7	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	□ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−001	診療科名	血液内科		
レジメン名	CHOP療法				
レジメン補足	シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン(ビンデシン)+プレドニゾロン				
がん腫など	悪性リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
プレドニゾロン (プレドニン)		60mg/m^2	●	○	○	○	○																							
ビンクリスチン (オンコビン)	壊死	1.4mg/m^2 (MAX：2mg)	○																											
ビンデシン (フィルデシン)	壊死	0.06mg/kg (MAX：4mg)	○																											
ドキソルビシン (アドリアシン)	壊死	50mg/m^2	●																											
シクロホスファミド (エンドキサン)	炎症	750mg/m^2	●																											

1コース期間	21 日	目標コース数	■有 （ 6～8 コース）	□無 （PDまで）
点滴時間	Day1：3時間			
注意事項など	Day2以降のプレドニゾロンは内服投与 制吐目的にアプレピタント(イメンド、プロイメンド)の投与を検討すること ※ドキソルビシンによる心毒性予防のため、累積投与量は500mg/m^{2}を超えないように注意すること			

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
③	生食	10mL	ワンショット
	プレドニゾロン	60mg/m^2	
④	生食	20mL	ワンショット
	以下のいずれかの薬剤を選択		
	ビンクリスチン	1.4mg/m^2	
	ビンデシン	0.06mg/kg	
⑤	生食	100mL	全開点滴
	ドキソルビシン	50mg/m^2	
⑥	生食	500mL	2時間点滴
	シクロホスファミド	750mg/m^2	
⑦	生食	50mL	フラッシュ