がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H18.9.7	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	□ 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)−002	診療科名	血液内科		
レジメン名	THP-COP療法				
レジメン補足	ピラルビシン+シクロホスファミド+ビンクリスチン(ビンデシン)+プレドニゾロン				
がん腫など	悪性リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1(週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
プレドニゾロン(プレドニン)		60mg/m^2	●	○	○	○	○																							
ピラルビシン(ピノルビン)	壊死	50mg/m^2	●																											
ビンクリスチン(オンコビン)	壊死	1.4mg/m^2 (MAX：2mg)	○																											
ビンデシン(フィルデシン)	壊死	0.06mg/kg (MAX：4mg)	○																											
シクロホスファミド(エンドキサン)	炎症	750mg/m^2	●																											
1コース期間		21 日	目標コース数							■有 （ 6～8 コース）													□無 （PDまで）						
点滴時間		Day1：3時間																												
注意事項など		Day2以降のプレドニゾロンは内服投与 制吐目的にアプレピタント(イメンド、プロイメンド)の投与を検討すること ※ピラルビシンによる心毒性予防のため、累積投与量には注意すること																												

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	パロノセトロン(アロキシ)	0.75mg	ワンショット
③	生食	10mL	ワンショット
	プレドニゾロン	60mg/m^2	
④	5%ブドウ糖液	20mL	ワンショット
	ピラルビシン	50mg/m^2	
⑤	生食	20mL	ワンショット
	以下のいずれかの薬剤を選択		
	ビンクリスチン	1.4mg/m^2	
	ビンデシン	0.06mg/kg	
⑥	生食	500mL	2時間点滴
	シクロホスファミド	750mg/m^2	
⑦	生食	50mL	フラッシュ