

がん化学療法レジメン

第3版

改訂日

R1.8.1

登録日	H17.11.13	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来	初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	悪性リンパ腫(ML)-005	診療科名	血液内科		
レジメン名	リツキシマブ療法				
レジメン補足					
がん腫など	悪性リンパ腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												
リツキシマブ		375mg/m ²	●																																							
1コース期間	1~3 週		目標コース数							■有 (8 コースまで)							□無 (PDまで)																									
点滴時間	Day1 : 約4時間(初回)、約2時間30分(2回目以降)																																									
注意事項など	<p>リツキシマブは生食にて10倍に希釈して投与すること</p> <p>本剤投与の30分前に抗ヒスタミン剤(クロルフェニラミン(ネオマレルミンTR錠6mg))、解熱鎮痛剤(ロキソプロフェン・アセトアミノフェンなど)の前投与を行うこと</p> <p>★注入開始速度は患者の状態に応じ適宜減速すること★</p> <p>注入速度に関連して、血圧降下・気管支痙攣・血管浮腫等の症状が出現するので、本剤の注入速度を守り、注入速度を上げる際は特に注意すること</p>																																									

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	50mL	ルートキーブ
②	生食	必要量	右図(※)
	リツキシマブ	375mg/m ²	
③	①の残りの生食でフラッシュ		

※投与速度※

〔初回投与時〕

最初の30分は50mL/Hで開始する。
患者の状態を十分観察しながら、30分ごとに50mL/Hずつ上げることができる。
(最大速度：400mL/H)

〔2回目以降〕

初回投与時に発現した症状が軽微であった場合、100mL/Hで開始し、30分ごとに100mL/Hずつ上げることができる。
(最大速度：400mL/H)

★流速up後は必ずバイタルチェックを行うこと★