がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H30.5.1	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	悪性リンパ種(ML)−041	診療科名	血液内科		
レジメン名	ロミデプシン療法				
レジメン補足					
がん腫	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫(PTCL)				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ロミデプシン（イストダックス）		14mg/m^2	●							●							●													
1コース期間	28日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：約4時間																													
注意事項など	中等度催吐性リスクのため、Day2-3にデキサメタゾンの内服（8mg）を行うこと																													

Day 1

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	投与方法点滴時間
①	生食	100mL	15分点滴
	グラニセトロン	3mg	
	デキサメタゾン（デキサート）	9.9mg	
②	生食	500mL	4時間点滴
	ロミデプシン（イストダックス）	14mg/㎡	
③	生食	50mL	フラッシュ