

がん化学療法レジメン

第1版 改訂日

| | | | | | |
|--------|-----------------|------|--|------|--|
| 登録日 | H30.9.13 | 実施区分 | <input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来 | 初回入院 | <input checked="" type="checkbox"/> 必要 |
| レジメン番号 | 悪性リンパ種(ML)-044 | 診療科名 | 血液内科 | | |
| レジメン名 | 【維持療法】オビヌツズマブ療法 | | | | |
| レジメン補足 | | | | | |
| がん腫 | 濾胞性リンパ腫 | | | | |

| 薬剤名 | 漏出 | 投与量 | 1 (週) | | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | |
|-------------------|-----|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| オビヌツズマブ (ガザイバ) | | 1000mg/body | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1コース期間 | 2ヶ月 | 目標コース数 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 (2年間) | | | | | | | | | | | | | | <input type="checkbox"/> 無 (PDまで) | | | | | | | | | | | | | |

点滴時間 Day1 : 約3時間30分

注意事項など

- ・2ヶ月ごとに最長2年間投与
- ・インラインフィルター付き輸液セットを用いること
- ・infusion reaction 予防のため、本剤投与30分前までに解熱鎮痛剤 (アセトアミノフェン・ロキソプロフェン) と抗ヒスタミン剤 (クロルフェニラミン (ネオマレルミンTR錠6mg)) の前投与を行うこと
- ★注入開始速度は患者の状態やinfusion reactionの有無に応じ適宜減速すること★
 注入速度に関連して、血圧降下・気管支痙攣・血管浮腫などの症状が出現するので、本剤の注入速度を守り、注入速度を上げる際は特に注意すること (流速up後は必ずバイタルチェックを行うこと)

Day 1

《メイン》 PVCフリー(フィルター付)の輸液セット

| 投与順序 | 投与薬剤名 | 投与量 単位 | 投与方法 点滴時間 |
|------|---------------|-----------|--------------|
| ① | 生食 | 50mL | ルートキープ |
| ② | 生食 | 210mL | 右図 (※) |
| | オビヌツズマブ | 1000mg | |
| ③ | ①の残りの生食でフラッシュ | | |

※投与速度※
 過去投与時のinfusion reaction症状が軽微であった場合
 25mL/hrで開始し、30分ごとに25mL/hrずつ
 上げることができる。
 (最大速度 : 100mL/hr)