

# がん化学療法レジメン

第2版 | 改訂日 | H29.6.8

登録日	H28.10.13	実施区分	<input type="checkbox"/> 入院のみ <input checked="" type="checkbox"/> 入院及び外来		初回入院	<input checked="" type="checkbox"/> 必要
レジメン番号	骨髄腫(MM)-007	診療科名	血液内科			
レジメン名	KRd療法					
レジメン補足	カルフィルゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン					
がん腫	再発又は難治性の多発性骨髄腫					

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルフィルゾミブ (カイロリス)	炎症	○ : 20mg/m <sup>2</sup>	○	○	※1コース目のみ					●	●							●	●											
		● : 27mg/m <sup>2</sup>	●	●																										
レナリドミド (レブラミド)		25mg/日 内服	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
デキサメタゾン (レナデックス)		40mg/日 内服	●							●								●									●			
1コース期間	28 日	目標コース数	□有 (    コース)							■無 (PDまで)																				
点滴時間	Day1 : 30分																													
注意事項など	初回投与時は必要に応じ、腫瘍崩壊症候群予防のためカルフィルゾミブ投与前後に十分な補液を行うこと 1コース目の1,2日目のみカルフィルゾミブは20mg/m <sup>2</sup> に減量して投与 2,9,16日目にデキサメタゾン4mgの内服を考慮 Infusion reaction出現防止のため、デキサメタゾンは投与開始前に内服 12コースまでは上記スケジュールで投与。13コース目以降は1,2,15,16日目にカルフィルゾミブを投与																													

## Day 1, 2, 8, 9, 15, 16

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量 単位	点滴時間 投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	5%ブドウ糖液	100mL	30分 点滴
	注射用水	必要量	
	カルフィルゾミブ	27mg/m <sup>2</sup>	
※カルフィルゾミブは1コース目のDay1, 2のみ20mg/m <sup>2</sup>			
②の投与終了後、①の残りの生食でフラッシュ			

★注射用水の必要量について★

カルフィルゾミブの投与量

40mg以下：注射用水20mL×1本

40mgを超える場合：注射用水20mL×2本