がん化学療法レジメン

第2版	改訂日	R1.10.10

登録日	H28.12.8	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	骨髄腫(MM)−008	診療科名	血液内科		
レジメン名	ERd療法				
レジメン補足	エロツズマブ+レナリドミド+デキサメタゾン				
がん腫	再発又は難治性の多発性骨髄腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
エロツズマブ (エムプリシティ)		10mg/kg	●							○							●							○						
レナリドミド (レブラミド)		25mg (内服)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
デキサメタゾン (レナデックス)		40mg/日 (※)	●							●							●							●						
1コース期間	28 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	(初回) 3時間30分 (2-4回目) 3時間 (5回目以降) 2時間45分																													
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること 点滴開始前までにアセトアミノフェン(400mg)の内服を行うこと 《エロツズマブの投与について》 1-2コース目はday 1, 8, 15, 22に、3コース目以降はday 1, 15に投与すること 《デキサメタゾンの投与について(※)》 週1回40mg/日を投与するが、エロツズマブ投与日はインフュージョンリアクション予防に8mgを静脈内投与し、28mgを経口投与すること エロツズマブ投与日のデキサメタゾン内服(28mg)は投与開始の3～24時間前までに行うこと																														

Day 1, 8, 15, 22

《メイン》 インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	50mL	全開点滴
	デキサメタゾン(デキサート)	6.6mg	
②	生食	100mL	45分点滴
	ファモチジン(ガスター)	20mg	
	クロルフェニラミン(ポララミン)	5mg	
③	生食	250mL	**右図(※)**点滴
	注射用水	必要量	
	エロツズマブ	10mg/kg	
④	生食	50mL	フラッシュ

※投与速度※

《初回》

開始−30分：30mL/H（0.5mL/分）
30分−60分：60mL/H（1.0mL/分）
60分−終了：120mL/H（2.0mL/分）

《2回目》

開始−30分：180mL/H（3.0mL/分）
30分−終了：240mL/H（4.0mL/分）

《3回目以降》

300mL/H（5.0mL/分）