がん化学療法レジメン

第2版	改訂日	

登録日	H29.6.8	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	■ 必要
レジメン番号	骨髄腫(MM)−009	診療科名	血液内科		
レジメン名	【週2回】Kd療法				
レジメン補足	カルフィルゾミブ+デキサメタゾン				
がん腫	再発又は難治性の多発性骨髄腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
カルフィルゾミブ (カイプロリス)	炎症	○：20mg/m^2	○	○	※1コース目のみ					●	●						●	●												
		●：56mg/m^2	●	●																										
デキサメタゾン (レナデックス)		20mg/日 内服	●	●						●	●						●	●						●	●					
1コース期間	28 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	Day1：30分																													
注意事項など	初回投与時は必要に応じ、腫瘍崩壊症候群予防のためカルフィルゾミブ投与前後に十分な補液を行うこと 1コース目の1,2日目のみカルフィルゾミブは20mg/m^{2}に減量して投与 Infusion reaction出現防止のため、デキサメタゾンは投与開始前に内服																													

Day 1, 2, 8 ,9, 15, 16

《メイン》

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	5%ブドウ糖液	50mL	30分点滴
	注射用水	必要量	
	カルフィルゾミブ	56mg/m^2	
	※カルフィルゾミブは1コース目のDay1，2のみ20mg/m^2 **※総輸液量を100mLに調製すること**		
②の投与終了後、①の残りの生食でフラッシュ			