がん化学療法レジメン

第1版	改訂日	

登録日	H29.11.9	実施区分	□ 入院のみ ■ 入院及び外来	初回入院	□ 必要
レジメン番号	骨髄腫(MM)−012	診療科名	血液内科		
レジメン名	ダラツムマブ単剤維持療法				
レジメン補足					
がん腫	再発又は難治性の多発性骨髄腫				

薬剤名	漏出	投与量	1 (週)							2							3							4						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ダラツムマブ (ダラザレックス)		16mg/kg	●																											
デキサメタゾン (レナデックス)		(※)																												
1コース期間	28 日		目標コース数							□有 （ コース）											■無 （PDまで）									
点滴時間	約4時間																													
注意事項など	インラインフィルター付き輸液セットを用いること 点滴開始1～3時間前に副腎皮質ホルモンとアセトアミノフェン(650-1,000mg)、抗ヒスタミン剤を投与すること 《デキサメタゾンの投与について(※)》 投与の要否については臨床試験等のデータを参考にして決定すること 内服もしくは静脈内投与を行う ダラツムマブ投与日はインフュージョンリアクション予防のためダラツムマブ投与開始前に投与すること																													

Day 1

《メイン》 インラインフィルター付きの輸液セット

投与順序	投与薬剤名	投与量単位	点滴時間投与方法
①	生食	100mL	ルートキープ
②	生食(＃)	500mL	**右図(※)** 点滴
	ダラツムマブ	16mg/kg	
②の投与終了後、①の残りの生食でフラッシュ			

※投与速度※

開始−1時間：100mL/H
1時間−2時間：150mL/H
2時間−終了：200mL/H